

Revisie bij: “Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2016 – Trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen” van 21 september 2017 en “Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2015 – Trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen, en aanpassing benchmarkwaardensystematiek” van 13 december 2016.

1. Tekstuele aanpassingen 2016 rapportage:

Paginanr.	Vorige tekst	Erratum Aangepaste tekst
38, 3 ^e alinea, 3 ^e regel	...benchmarkcategorieën wijzingen in zeer beperkte mate.	...benchmarkcategorieën wijzigen in zeer beperkte mate.

2. Macroliden/lincosamiden zijn voor de pluimveesector gedefinieerd als tweede keuze middelen in verband met het risico op resistentieselectie in *Campylobacter* spp., dit is in zowel de 2015 als 2016 rapportage niet meegenomen.

Dit resulteert in de volgende wijzigingen voor de 2016 rapportage:

Tabel 2 (pagina 15)		Vleeskuikens					Kalkoenen			
		2012	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Vorige waarde	Therapeutische groep									
	Eerste keuze	7,80	6,91	5,51	4,24	2,74	22,47	19,87	21,17	13,46
	% eerste keuze van totaal	42,23%	50,57%	34,97%	29,07%	26,87%	76,53%	64,63%	58,89%	50,95%
	Macroliden/lincosamiden	1,11	0,44	0,35	0,48	0,25	3,07	2,12	1,98	1,18
	Tweede keuze	9,84	6,50	10,07	10,28	7,38	5,13	9,59	13,57	11,36
	% tweede keuze van totaal	53,23%	47,60%	63,91%	70,45%	72,41%	17,46%	31,18%	37,76%	42,99%
	Macroliden/lincosamiden	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Erratum	Eerste keuze	6,69	6,47	5,16	3,76	2,49	19,40	17,75	19,18	12,29
	% eerste keuze van totaal	36,20%	47,36%	32,72%	25,79%	24,42%	66,07%	57,73%	53,37%	46,49%
	Macroliden/lincosamiden	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Tweede keuze	10,95	6,94	10,43	10,75	7,63	8,20	11,71	15,56	12,54
	% tweede keuze van totaal	59,25%	50,81%	66,15%	73,73%	74,86%	27,92%	38,08%	43,29%	47,45%
	Macroliden/lincosamiden	1,11	0,44	0,35	0,48	0,25	3,07	2,12	1,98	1,18

Tabel 6 en tabel 7 (pagina 24 en 25):

- Achter de gebruikscijfers van eerste keuze macroliden/lincosamiden bij de “vleeskuikens” (584 kg), “kalkoenen” (458 kg) en “overig pluimvee” (818 kg) hoort een noot “*”.
- Onder beide tabellen toevoegen: “* Macroliden/lincosamiden zijn voor de pluimveesector gedefinieerd als tweede keuze middelen. Omdat de verkoopgegevens niet naar diersector zijn op te splitsen wordt macroliden/lincosamiden-gebruik door alle pluimvee-categorieën bij eerste keuze weergegeven om een eenduidige vergelijking met de verkoopcijfers mogelijk te maken.”

Tabel en paginanr.	Variabele	Vorige waarde	Erratum Aangepaste waarde
Tabel B12 - p.61	Keuze (Macroliden/lincosamiden)	1	2
Tabel B15 - p.64	Keuze (Macroliden/lincosamiden)	1	2

Dit resulteert in de volgende wijzigingen voor de 2015 rapportage:

- Pagina 17, 5^e alinea, 12^e regel: “..tussen 2012 en 2015 gedaald is van **42%** naar **29%**” wordt “tussen 2012 en 2015 gedaald is van **36%** naar **26%**”.
- Pagina 18, 1^e alinea, 6^e regel: “..is tussen 2013 en 2015 gedaald van **77%** naar **59%**” wordt “is tussen 2013 en 2015 gedaald van **66%** naar **53%**”.


Tabel 2 (pagina 19)		Vleeskuiken				Kalkoen		
		2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Vorige waarde	Therapeutische groep							
	eerste keuze	7,80	6,91	5,51	4,24	22,47	19,87	21,17
	% eerste keuze van totaal	42%	51%	35%	29%	77%	65%	59%
	Macroliden/lincosamiden	1,11	0,44	0,35	0,48	3,07	2,12	1,98
	tweede keuze	9,84	6,50	10,07	10,28	5,13	9,59	13,57
	% tweede keuze van totaal	53%	48%	64%	70%	17%	31%	38%
	Macroliden/lincosamiden	*	*	*	*	*	*	*
Erratum	eerste keuze	6,69	6,47	5,16	3,76	19,40	17,75	19,18
	% eerste keuze van totaal	36%	47%	33%	26%	66%	58%	53%
	Macroliden/lincosamiden	*	*	*	*	*	*	*
	tweede keuze	10,95	6,94	10,43	10,75	8,20	11,71	15,56
	% tweede keuze van totaal	59%	51%	66%	74%	28%	38%	43%
	Macroliden/lincosamiden	1,11	0,44	0,35	0,48	3,07	2,12	1,98

Tabel 4 (pagina 22):

- Achter de gebruikscijfers van eerste keuze macroliden/lincosamiden bij de “vleeskuikens” (1090 kg) en “kalkoenen” (686 kg) hoort een noot “*”.
- Onder de tabel toevoegen: “* Macroliden/lincosamiden zijn voor de pluimveesector gedefinieerd als tweede keuze middelen. Omdat de verkoopgegevens niet naar diersector zijn op te splitsen wordt macroliden/lincosamiden-gebruik door alle pluimvee-categorieën bij eerste keuze weergegeven om een eenduidige vergelijking met de verkoopcijfers mogelijk te maken.”

- De weergegeven verdeling 1^e, 2^e en 3^e keuze middelen per kalkoenbedrijf in 2013, 2014 en 2015 in figuur B14 (pagina 68) wordt:

Vorige figuur



Erratum

