

GIPS

verbetert de bodemstructuur

Een goede bodemstructuur is de basis van succesvol telen!

Ferto-Gips is een product dat rijk is aan calcium in sulfaatvorm (CaSO_4). Ferto-Gips, ofwel calciumsulfaat heeft een positief effect op de bodemstructuur, met name op kleigronden met een hoge pH. Gips is pH neutraal en lost goed op in de bodem. Een goede bodemstructuur is belangrijk voor een teler. Waterregulatie, beworteling, ziektevering en bereikbaarheid van het land zijn essentieel voor een sterk en gezond gewas, en geen beperkingen bij grondbewerking en oogst. Voor een goede bodemstructuur is het belangrijk dat er voldoende calcium aanwezig is. Calcium houdt de kleiplaatjes op een mooie afstand van elkaar, voor een luchtige, rulle structuur. Bovendien zorgt calcium voor prima binding van de kleiplaatjes onderling. Ook op zandgrond is calcium belangrijk, het zorgt voor binding van de organische stof.

Optimaliseer de bodemstructuur met gips!



WWW.TRIFERTO.NL

GIPS

verbetert bodemstructuur



Opname Ca per gewas

Aardappelen : 10 - 20 kg/ha
 Tarwe, gerst : 10 - 20 kg/ha
 Uien : 20 - 50 kg/ha
 Mais : 20 - 50 kg/ha
 Peen : 50 - 80 kg/ha
 Suikerbieten : > 80 kg/ha



Tip: dosering verdelen over 2 jaar

Door de advies dosering Gips te verdelen over 2 jaar, doet u aan kostenspreiding en ploegt u het 2 e jaar het gips uit de bovenlaag naar de diepere grondlaag om vervolgens weer gips toe te passen in de bovenlaag. Op deze wijze heeft u de garantie dat het gips na 2 jaar in de volledige bouwvoor optimaal zijn werk kan doen.

Advies Gips bemesting

Een gift van 6 tot 12 ton Gips per hectare voorafgaand aan de aardappelen-, bieten- of uienteelt zorgt voor een betere rooibaarheid, minder tarra en een bodem die gemakkelijker te bewerken is.

- Adviesgift per hectare ligt tussen de 6 en 12 ton per hectare.
- Bij voorkeur toedienen in de bovenste teeltlaag alwaar wortelontwikkeling of knolzetting plaatsvindt.
- Toedienen na het ploegen, bij voorkeur ligt inwerken in toplaag met bijvoorbeeld rotorkoep.
- Toedienen in de winter op bevroren grond voorkomt spoorvorming / structuurschade.
- Calcium spoelt uit: jaarlijks 30 tot 300 kilo per hectare. Daarnaast wordt calcium met de oogst afgevoerd, de hoeveelheid hangt af van het gewas.



Contact

Heeft interesse in de gips meststoffen van Triferto, en wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Triferto BV
 Tel: +31 (0) 0314-374000
 E-Mail: info@triferto.eu
www.triferto.eu